

วิธีการสั่งยาที่ถูกต้องเพื่อลด Prescribing error

1. ให้อัปเดตเครื่องหมายถูก mode2 ตามภาพ (ทำแค่ครั้งแรกที่ใช้โปรแกรม ครั้งต่อไปโปรแกรมจะจำค่าให้เอง)

The screenshot shows the 'การสั่งยา' (Prescription) section of the software. The 'Mode 2' checkbox is highlighted with a red box. Below it, there is a table of prescriptions with columns for 'ลำดับ' (Sequence), 'ยี่ห้อ' (Brand), 'FL', 'P', 'จุดบันทึก' (Record Point), 'ชื่อรายการ' (Item Name), 'วิธีใช้' (Usage), 'จำนวน' (Quantity), and 'ราคา' (Price). The table contains three rows of data.

ลำดับ	ยี่ห้อ	FL	P	จุดบันทึก	ชื่อรายการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา
1				100 ศูนย์คอมพิวเตอร์	ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาทำการ(Y)		1	
2				100 ศูนย์คอมพิวเตอร์	ค่าเจาะน้ำค้ำ (Amniocentesis) บัตรทองที่มีภาวะเสี่ยง		1	3,200
3				082 ห้อง LAB รวม	ค่า Glucose (Serum)		1	

2. ในกรอบสีแดงจะเป็นวิธีใช้ยาที่โปรแกรมใส่ไว้ให้ แต่สามารถเปลี่ยนวิธีใช้ยาได้โดยคีย์ตามสูตร **เอกสารแนบ**

The screenshot shows the 'วิธีใช้' (Usage) field highlighted with a red box. The field contains the text '1 OR1 Q4-6 PF รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลาปวดหรือมีไข้'. Below the field, there is a table of prescriptions with columns for 'ลำดับ' (Sequence), 'ยี่ห้อ' (Brand), 'FL', 'P', 'จุดบันทึก' (Record Point), 'ชื่อรายการ' (Item Name), 'วิธีใช้' (Usage), 'จำนวน' (Quantity), and 'ราคา' (Price). The table contains three rows of data.

ลำดับ	ยี่ห้อ	FL	P	จุดบันทึก	ชื่อรายการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา
1				100 ศูนย์คอมพิวเตอร์	ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาทำการ(Y)		1	
2				100 ศูนย์คอมพิวเตอร์	ค่าเจาะน้ำค้ำ (Amniocentesis) บัตรทองที่มีภาวะเสี่ยง		1	3,200
3				082 ห้อง LAB รวม	ค่า Glucose (Serum)		1	

เอกสารแนบวิธีใช้ยา

V

V

V

V

V

วิธีการใช้ยาในระบบ HOSxP

ยารับประทาน โดยทั่วไป ประกอบด้วยตำแหน่งการ key 4 หลัก

ตัวอย่าง HALOPERIDOL 5 MG.TAB

11pt



รับประทานครั้งละ 1 เม็ด, วันละ 1 ครั้ง, หลังอาหาร, เข้า

<u>1</u>	<u>1</u>	<u>p</u>	<u>t</u>
หลักที่ 1	หลักที่ 2	หลักที่ 3	หลักที่ 4

หลักที่ 1 หมายถึง รับประทานครั้งละกี่เม็ด, กี่ซองชา, กี่ซองโด้ะ และครั้งละกี่ซีซี

หลักที่ 2 หมายถึง จำนวนครั้งที่ใช้ยาต่อ 1 วัน

หลักที่ 3 หมายถึง เวลาไหน

a : ก่อนอาหาร

p : หลังอาหาร

หลักที่ 4 หมายถึง ชนิดของยา

t : ยาเม็ด

s : ยาน้ำซองชา

j : ยาน้ำซองโด้ะ

Z : ซีซี (CC)

วิธีใช้ที่เป็นข้อแตกต่างไป

11ht : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด, วันละ 1 ครั้ง, ก่อนนอน

21hs : รับประทานครั้งละ 2 ซองชา, วันละ 1 ครั้ง, ก่อนนอน

troche : อมครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชม. เวลามีอาการเจ็บคอ

1.5 prs pcm : รับประทานครั้งละ 1 ซองชาครึ่ง ทุก 4-6 ชั่วโมง เวลาปวดหรือมีไข้

.51pt : รับประทานครั้งละครึ่งเม็ด, วันละ 1 ครั้ง, หลังอาหาร, เข้า

21 ad pt : รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันเว้นวัน หลังอาหารเข้า

dtp : จิบเวลาไอ

ยาหยอดตา ประกอบด้วย : ชนิดของยา (ตา = ed), ข้างที่เป็น (r = ขวา; l = ซ้าย ; b = ทั้ง 2 ข้าง), จำนวนครั้งที่ใช้

edr1 : หยอดตาขวา ครั้งละ 1 - 2 หยด วันละ 1 ครั้ง เข้า

edb4 : หยอดตาทั้ง 2 ข้าง ครั้งละ 1 - 2 หยด วันละ 4 ครั้ง เข้า - กลางวัน - เย็น - ก่อนนอน

edl1hs : หยอดตาซ้าย ครั้งละ 1 - 2 หยด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

edeq4 : หยอดตาข้างที่เป็น ครั้งละ 1 - 2 หยด ทุก 4 ชั่วโมง

ยาหยอดหู ประกอบด้วย : ชนิดของยา (หู = ea), ข้างที่เป็น (r = ขวา; l = ซ้าย ; b = ทั้ง 2 ข้าง), จำนวนครั้งที่ใช้

ear2 : หยอดหูขวา ครั้งละ 1 - 2 หยด วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น

ea13 : หยอดหูซ้าย ครั้งละ 1 - 2 หยด วันละ 3 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น

ea4 : หยอดหูข้างที่เป็น ครั้งละ 1 - 2 หยด วันละ 4 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น - ก่อนนอน

ยาป้ายตา

ep14 : ป้ายตาซ้าย วันละ 4 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น - ก่อนนอน

ep3 : ป้ายตาข้างที่เป็น วันละ 3 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น

ยาทา

ap2 : ทาบางๆ เฉพาะที่ วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น

ap3 : ทาบางๆ เฉพาะที่ วันละ 3 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น

apm4 : ป้ายแผลในปาก วันละ 4 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น - ก่อนนอน

ยาสูดพ่น

mdi2x2 : พ่นยา 2 ที่ วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น

mdi1puffiq4 : พ่นยา 1 ที่ โดยกดก้านขวดยาลงจนสุด 1 ครั้ง พร้อมสูดยาทุก 4 ชั่วโมง เวลามีอาการหอบ

ยาพ่นจมูก

ns12 : พ่นจมูก 1 ข้าง วันละ 2 เวลา เช้า - เย็น

ns21 : พ่นจมูก 2 ข้าง ข้างละ 1 ครั้ง วันละ 1 ครั้ง เช้า

ns22 : พ่นจมูก 2 ข้าง ข้างละ 2 ครั้ง วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น

ยาเหน็บทวาร

rect sp h : เหน็บทวารครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

rectal 12 mh : เหน็บทวารครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า - ก่อนนอน

ยาเหน็บช่องคลอด

11 vgsp : สอดช่องคลอด ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

21 vgsp : สอดช่องคลอด ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

ยาฉีด

im นำหน้า หมายถึง ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

iv นำหน้า หมายถึง ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ

sc นำหน้า หมายถึง ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

หรือคลิกที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อเข้าไปแก้ไขการใช้ยา ดังรูป

บันทึกข้อมูล

การสั่งยา Remed

ชื่อยา/คำบริจาร WD [Ctrl+W] Mode 2 Task จำนวน หน่วยบรรจุ วิธีใช้ Dose หน่วย ความถี่ เวลา ราคา ใช้สำหรับ

AMOX + CLAVUL [ER] [AMK] 1 gm TAB. 1 12PT (1 เม็ด * 2 PC) รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 14.50 0

ผลจากช่วย ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แก้ไข Lock + เพิ่ม Quick r

จุดบันทึก 100 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ภาษา ไทย All ผู้สั่ง ภก.กานต์ รัตนอรุณ (พญ.) All รับยาที่ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ออกคำรับ

การส่งตัว

การวินิจฉัย

Consult

ยา/คำบริจาร

Note

ประวัติ

การตรวจร่างกาย

"BENZATHINEBENZYL PENICILLIN = ssddd", "ยาเม็ดสีฟ้า = หลอดสอบ"

ลำดับ	มีแผน	FL	P	จุดบันทึก	ชื่อรายการ	วิธีใช้	จำนวน	ราคา
1				100 ศูนย์คอมพิวเตอร์	คำบริจารผู้ป่วยนอก ในเวลารายการ(Y)		1	
2	✓			100 ศูนย์คอมพิวเตอร์	ค่าเจาะน้ำค้ำ (Amniocentesis) บัตรทองที่มีภาวะเสี่ยง		1	3,200
3				082 ห้อง LAB รวม	ค่า Glucose (Serum)		1	
4	✓			100 ศูนย์คอมพิวเตอร์	para 325 mg tab.[ER](ERS) 325 MG TAB.	>รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร เข้า-เย็น หรือเวลามีอาการ	1	

แก้ไขวิธีใช้

วิธีใช้

บรรทัดที่ 1 รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด

บรรทัดที่ 2 วันละ 2 ครั้ง

บรรทัดที่ 3 หลังอาหารเข้า-เย็น

☐ ยังคงใช้วิธีที่กำหนดเอง

ตกลง

เมื่อทำการแก้ไขวิธีใช้ยาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ตกลง

3.ถ้าต้องการคีย์วิธีการใช้ยาเองทั้งหมดให้กด * และเลือก ใช้ตามแพทย์สั่ง

บันทึกข้อมูล

ทั่วไป

หัตถการ

โรคเรื้อรัง

การให้คำแนะนำ

กายเขย่า

การนัดหมาย

การส่งตัว

การวินิจฉัย

Consult

ยา/คำปรึกษา

Note

ผู้ติดตาม

การตรวจร่างกาย

การสั่งยา  Remedy

ชื่อยา/คำปรึกษา ☒ Mode 2

จำนวน

หน่วยบรรจุ

วิธีใช้

Dose

หน่วย

ความถี่

เวลา

ราคา

ใช้สำหรับ

para 325 mg tab. [ER] 325 MG TAB.

ผลการช่วย

ถูกบันทึก ภาษา All

กายเขย่า

"BENZATHINEBENZYL PENICILLIN = ssddd"

ลำดับ	ยืนยัน FL	P	ถูกบันทึก	ชื่อรายการ
1	☒	☒	☒	คำปรึกษาผู้ป่วยนอกในเวลาร
2	☒	☒	☒	คำแนะนำค่าแล (Amniocent
> 3	☒	☒	☒	ค่า Glucose (Serum)

Acaprid[10 unit SC stat] 10 unit SC stat

***aminop[500mg+d5w500] 500 mg + D5W 500 ml IV drip 20 ml/hr

***calglu[1 amp iv push] 1 AMP IV slowly push

***chemo[...mg+NSS 100 ml IV free flow] ** mg+NSS 100 ml IV free flow

***chw[เตรียมให้ละออง ทุก 6 ชม เติมน้ำอาหาร] เตรียมให้ละอองก่อนแคตทีล ครั้งละ 1 เมล็ด ทุก 6 ชั่วโมง

***Dobu[200 mg+nss 100 ml] 200 mg + NSS 100 ml IV Drip 10 ml/hr

***Dopa[200 mg+NSS 100 ml] 200 mg + NSS 100 ml IV Drip 10 ml/hr

หมวด None selected ☐ แสดงเฉพาะรายการที่สั่ง

กำหนดจำนวนยาสำหรับ วัน Auto DI C

ED NED อื่นๆ เข้าได้ เข้าไม่ได้ ลูกหนี้ ส่วนลด รวม

โปรแกรมจะ pop up หน้าจอ ดังรูป

แก้ไขวิธีใช้

วิธีใช้

บรรทัดที่ 1

บรรทัดที่ 2

บรรทัดที่ 3

☐ บังคับใช้วิธีที่กำหนดเอง

โดยบรรทัดที่ 1 ให้ใส่ **วิธีการใช้ยา** เช่น รับประทานครั้งละ....., หยอดหูข้าง.....ครั้งละ.....,

ฉีดเข้าหลอดเลือดดำครั้งละ..... , ทาบางๆ บริเวณที่เป็น เป็นต้น

บรรทัดที่ 2 ให้ใส่ **ความถี่** เช่น วันละ.....ครั้ง , ทุก.....ชั่วโมง , ก่อนอาหาร หรือ หลังอาหาร เป็นต้น

บรรทัดที่ 3 ให้ใส่ **รายละเอียด** เช่น เข้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน